

# ANUNT IMPORTANT

Cum sa fi cu un pas inaintea PESTEI PORCINE AFRICANE

Pesta porcina africana este o boala virala.

In mod obisnuit este mortala pentru porcii domestici si mistreti.

Nu exista vaccin sau tratament pentru aceasta boala.

Din aceasta cauza provoaca serioase probleme socio-economice in tarile afectate.

Virusul rezista cateva luni in mediul inconjurator si cadavre.

Prepararea sau afumarea carnii de porc NU distruge virusul.

Oamenii nu se imbolnavesc dar ajuta la raspandirea virusului prin hainele sau echipamntele contaminate.

Semnele clinice ale bolii sunt variabile si nu sunt usor de recunoscut

Animalele afectate pot avea unul sau multe semne clinice, dupa cum urmeaza:

Febra mare, apatie si imposibilitate de a sta in picioare.

Voma, diaree, uneori sange.

Pete rosi – albastrui pe piele, in special in zonele urechilor si ratului.

Tuse si respiratie ingreunata.

Avorturi spontane, nastere de fetusi morti si nesiguranta in mers a purceilor.

Majoritatea animalelor infectate mor in 10 zile.

Contaminarea animalelor sanatoase se poate produce in multe feluri:

Prin contactul direct al porcilor sanatosi cu cei bolnavi.

Prin hranirea acestora cu resturi alimentare contaminate.

Contactul cu materiale contaminate.

Contactul cu oamenii care poarta haine si incaltaminte contaminate.

Contactati imediat medicul veterinar daca suspectati ca efectivul de animale este contaminat.

Nu deplasati animalele din ferma sau gospodarie.

Intodeauna schimbati-va imbracamintea si incaltamintea atunci cand parasiti ferma sau gospodaria.

Inainte de a achizitiona furaje, asternut si porci, asigurati-va ca acestea provin din unitati verificate care au implementate toate masurile de siguranta pentru a evita patrunderea virusului.

Asigurati-va ca porcii din gospodaria dumneavoastra nu intra in contact cu mistreti sau porcii din alte gospodarii.

Niciodata sa nu hraniti porcii cu resturi alimentare.

Evitati cresterea porcilor in padourile exterioare, in zonele in care evolueaza Pesta Porcina

Africana.

Achizitia si transportul carni si a preparatelor din carne de porc din zonele infectate pot raspandi virusul.

Vanatorii si cainii acestora nu trebuie sa vina in contact cu porcii domestici dupa vanatoare.

Fermierii sau vanatorii sa nu arunce pe camp sau in paduri resturi rezultate in urma eviscerarii carcaselor de porci domestici sau mistreti.

Nu aruncati resturi alimentare sau gunoi in zonele care pot fi frecventate de mistreti.

Contactati medicul veterinar daca gasiti cadavre de mistreti chiar daca in zona NU evolueaza

PESTA PORCINA AFRICANA.

P R I M A R

DANIEL

